

Verwijde  
buikslagader

## Behandeling

Actieve controle




Litteken



Ingreep via de lies



Open operatie




Verwijde  
buikslagader

## Effect van de behandeling

Actieve controle

Ruptuur risico verlagen



Langer leven



Ingreep via de lies



Open operatie




## Actieve controle



Angst

## Ingreep via de lies




Overlijden



Extra ingreep

## Open operatie



Overlijden



Littekenbreuk

Andere operatie-  
risico's zoals:

- Wondinfectie
- Longontsteking
- Verslechtering  
nierfunctie
- Verminderde  
doorbloeding  
van darmen of  
ruggenmerg

## Actieve controle



minimaal 1 keer per jaar

## Ingreep via de lies







minimaal 1 keer per jaar

## Open operatie

Meestal nog 1 à 2 keer

Verwijde  
buikslagader

## Verdoving en ziekenhuisverblijf

	Verdoving	Ziekenhuisverblijf in dagen
<b>Actieve controle</b>	✗	✗
<b>Ingreep via de lies</b>		
<b>Open operatie</b>		

Verwijde  
buikslagader

## Mag u alles blijven doen?

Tijdens de actieve controle en na herstel van uw ingreep mag u het volgende blijven doen:



Lichamelijke  
inspanning



Reizen



Sauna

Let daarbij wel op het volgende:



Niet roken



Normale bloeddruk



Normaal cholesterol